

Mal di testa

Globuli

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Mal di testa. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stocaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Mal di testa

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Gelsemium sempervirens (HAB) D12 2.5 mg / Hepar sulfuris (HAB) D12 2.5 mg / Iris versicolor (HAB) D15 2.5 mg / Kalium carbonicum (HAB) D12 (PH.Eur.Hom.3.1.1) 2.5 mg.

Sostanze ausiliarie

Xilitolo; carbonato di calcio.

1 g corrisponde a 70-90 globuli

Numero dell'omologazione

51449 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Mal di testa?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2023 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o seguendo le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occasione.

Quando si usa SIMILASAN Mal di testa?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Mal di testa può essere usato in caso di mal di testa; cefalea tensiva; come ausilio alla terapia dell'emicrania (Dopo aereo discusso con il medico).

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il dolore è intenso o persistente, consultare il proprio medico.

Se i dolori persistono per più di 5 giorni o in caso di febbre per più di 3 giorni, il preparato non deve essere utilizzato se non su prescrizione del medico. Se il mal di testa si è manifestato già da parecchio tempo, di regola si nota un netto miglioramento solo dopo quattro - sei settimane di trattamento.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Mal di testa.

Quando non si può assumere SIMILASAN Mal di testa e quando la sua somministrazione / il suo uso richiede prudenza?

Nei bambini sotto i 6 anni, SIMILASAN Mal di testa può essere usato solo su prescrizione medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN Mal di testa durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Mal di testa?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini dai 6 anni e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- **Sintomi acuti:** Ogni mezz'ora - un'ora. Quando i disturbi si attenuano, diminuire la frequenza.
- **Disturbi cronici:** 3 volte al giorno.
- **Per la completa guarigione:** 1-2 volte al giorno.

Averenze per l'assunzione:

- Lasciare sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Nei bambini sotto i 6 anni, SIMILASAN Mal di testa può essere usato solo su prescrizione medica.

Si attenda alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Mal di testa?

Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Mal di testa e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.