

Überanstrenzte Augen N**Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Überanstrenzte Augen N angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Überanstrenzte Augen N bei überanstrenchten, tränenden Augen und unterstützend bei intensiver Beanspruchung der Augen; angewendet werden. Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Überanstrenzte Augen N gleichzeitig eingenommen werden darf.

Bei Augenbeschwerden ist das Tragen von Kontaktlinsen nicht angezeigt.

Wenn Sie jedoch auf Kontaktlinsen angewiesen sind, entfernen Sie diese vor dem Eintropfen und setzen Sie die Linsen frühestens 15 Minuten nach der Behandlung wieder ein. Empfehlenswert ist die Anwendung auch nach dem Entfernen der Linsen, abends vor dem Schlafengehen und morgens beim Erwachen, mind. 15 Min. vor dem Einsetzen der Linsen.

Beachten Sie, dass ein symptomatisches Auge gegenüber Linsen empfindlicher reagiert.

Wenn nach 2-3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z.B. eine Abnahme der Sehschärfe oder Schmerzen, ist unverzüglich ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wann darf SIMILASAN Überanstrenzte Augen N nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Darf bei Kindern unter 6 Jahren nur auf ärztliche Verschreibung angewendet werden.

Bei Linsentrübungen (Grauer Star, Katarakt) oder Grünem Star (Glaukom) nur nach ärztlicher Diagnose anwenden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äußerlich anwenden!

Wie verwenden Sie SIMILASAN Überanstrenzte Augen N?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: Ein bis mehrere Male pro Tag 1 Tropfen pro Auge, maximal 10-mal täglich 1 Tropfen pro Auge.

Darf bei Kindern unter 6 Jahren nur auf ärztliche Verschreibung angewendet werden.

Anwendung:

- Einen Tropfenbehälter abtrennen und Flüssigkeit zur Kugelspitze schütteln. Flachen Teil mit Kugelspitze durch eine Drehbewegung vom Tropfenbehälter abtrennen.
- Augentropfenbehälter mit Zeigefinger und Daumen mit der Spitze nach unten über das offene Auge halten, zusammenpressen und Tropfen ins Auge trüpfeln.
- Für jede Anwendung einen neuen Augentropfenbehälter verwenden (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).



Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Anwendung des Arzneimittels bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Überanstrenzte Augen N haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmern). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Überanstrenzte Augen N ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für SIMILASAN Überanstrenzte Augen N sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Angebrochene Augentropfenbehälter sofort verwenden und nach Gebrauch wegwerfen (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in SIMILASAN Überanstrenzte Augen N enthalten?

1 ml Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Senecio cineraria (HAB) D6 0.3033 ml / Natrium chloratum (HAB) D6 0.3033 ml (Ph.Eur. Hom. 3.1.) / Ruta graveolens (HAB) D6 0.3033 ml

Hilfsstoffe

Trinatriumcitrat; Natriumchlorid; Salzsäure; Wasser für Injektionszwecke

Zulassungsnummer

67564 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Überanstrenzte Augen N? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

- Packung mit 20 Monodosen zu 0,40 ml

Zulassungsinhaberin

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Diese Packungsbeilage wurde im August 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Yeux surmenés N**Information destinée aux patients**

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre dragueuse. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre dragueuse. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN Yeux surmenés N est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Yeux surmenés N peut être utilisé en cas d'yeux surmenés et larmoyants et en traitement de soutien en cas de sollicitation intensive des yeux. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Yeux surmenés N peut être utilisé simultanément.

En cas de troubles oculaires, le port de lentilles de contact n'est pas recommandé.

Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en passer, retirez-les avant de mettre les gouttes et replacez vos lentilles de contact au plus tôt 15 minutes après le traitement. L'utilisation est également conseillée le soir, après le retrait des lentilles, avant d'aller se coucher et le matin au réveil, au moins 15 minutes avant de les remettre.

Veuillez noter qu'un œil symptomatique réagira de manière plus sensible aux lentilles.

Si aucune amélioration n'intervient après 2 à 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin. En cas d'aggravation ou si de nouveaux symptômes apparaissent, p. ex. baisse de l'acuité visuelle ou douleurs, il convient de consulter immédiatement un médecin.

Quand SIMILASAN Yeux surmenés N ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne doit être administré aux enfants de moins de 6 ans que sur prescription médicale.

En cas d'opacification du cristallin (cataracte) ou de glaucome, utiliser uniquement après diagnostic médical.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre dragueuse si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication!).

Comment utiliser SIMILASAN Yeux surmenés N?


Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans: 1 goutte par œil une à plusieurs fois par jour, au maximum 1 goutte par œil 10 fois par jour.

Ne doit être administré aux enfants de moins de 6 ans que sur prescription médicale.

Utilisation:

- Détachez une dosette contenant les gouttes pour les yeux et secouez-la pour déplacer le liquide vers la pointe en forme de boule. Tordre la partie plate avec la pointe arrondie pour la détacher de la monodose.
- Tenir la monodose entre le pouce et l'index avec la pointe tournée vers le bas juste au-dessus de l'œil ouvert; presser pour verser le liquide goutte à goutte dans l'œil.
- Utiliser une nouvelle monodose à chaque application (ne se conserve pas, car ne contient pas de conservateur).



Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, l'administration du médicament doit être répétée lorsque l'effet diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre dragueuse.

Quels effets secondaires SIMILASAN Yeux surmenés N peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Yeux surmenés N et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueuse.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Yeux surmenés N n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre dragueuse.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Utiliser aussitôt les monodoses ouvertes et les jeter après application (le liquide ne se conserve pas, car il ne contient pas d'agent conservateur).

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre dragueuse.

Que contient SIMILASAN Yeux surmenés N?

1 ml de liquide contient:

Principes actifs

Senecio cineraria (HAB) D6 0.3033 ml / Natrium chloratum (HAB) D6 0.3033 ml (Ph.Eur. Hom. 3.1.) / Ruta graveolens (HAB) D6 0.3033 ml

Excipients

Citrate trisodique; chlorure de sodium; acide chlorhydrique; eau pour préparations injectables

Numéro d'autorisation

67564 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN Yeux surmenés N? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

- Emballage de 20 monodoses de 0,40 ml

Titulaire de l'autorisation

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Occhi affaticati N**Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occasione.

Quando si usa SIMILASAN Occhi affaticati N?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Occhi affaticati N può essere usato in caso di occhi sovraffaticati che lacrimano e come forma di aiuto in caso di occhi intensamente sollecitati.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Occhi affaticati N.

In caso di disturbi agli occhi, è sconsigliato portare lenti a contatto.

Se tuttavia sceglie di indossare lenti a contatto, le rimuova prima di instillare le gocce per gli occhi e le indossa nuovamente almeno 15 minuti dopo il trattamento. Si consiglia altresì di attendere almeno 15 minuti per l'applicazione delle gocce per gli occhi dopo aver rimosso le lenti, la sera prima di andare a letto e la mattina al risveglio.

Ricordi che un occhio sintomatico reagisce più sensibilmente alle lenti a contatto.

Se dopo 2-3 giorni non si nota un miglioramento, si rivolga a un medico. In caso di peggioramento o di comparsa di nuovi sintomi, ad es. riduzione dell'acuità visiva o dolore, si rivolga immediatamente a un medico.

Quando non si può usare SIMILASAN Occhi affaticati N e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Può essere somministrato ai bambini sotto i 6 anni solo su prescrizione medica.

In caso di opacizzazione del cristallino (cataratta) o glaucoma applicare solo dopo diagnosi medica. Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Come usare SIMILASAN Occhi affaticati N?


Se non diversamente prescritto dal medico:

Adulti, adolescenti e bambini dai 6 anni: 1 goccia per occhio, da una a più volte al giorno, massimo 1 goccia per occhio 10 volte al giorno.

Può essere somministrato ai bambini sotto i 6 anni solo su prescrizione medica.

Utilizzo:

- Staccare un contenitore monodoso e agitarlo per far scendere il liquido nella punta arrotondata. Staccare la parte piatta dalla punta arrotondata con un movimento rotatorio.
- Tenere il contenitore monodoso con il dito indice e il pollice, con la punta rivolta verso il basso sopra l'occhio aperto, premere e instillare le gocce nell'occhio.
- A ogni utilizzo, usare un nuovo contenitore monodoso di gocce per gli occhi (non si conserva, poiché privo di conservanti).



L'efficacia della somministrazione può variare individualmente. In generale, ripetere la somministrazione del rimedio quando si percepisce un calo dell'efficacia o il ritorno dei disturbi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Occhi affaticati N?

Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Occhi affaticati N e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Occhi affaticati N. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, utilizzare immediatamente il contenitore monodoso e poi smaltirlo dopo l'uso (non si conserva, poiché privo di conservanti).

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori indicazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Occhi affaticati N?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Senecio cineraria (HAB) D6 0.3033 ml / Natrium chloratum (HAB) D6 0.3033 ml (Ph.Eur. Hom. 3.1.) / Ruta graveolens (HAB) D6 0.3033 ml

Sostanze ausiliarie

Citato di trisodio; cloruro di sodio; acido cloridrico; acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

67564 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Occhi affaticati N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

- Confezione con 20 monodosi da 0,40 ml

Titolare dell'omologazione

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2023 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).